

精管結紮術（パイプカット術） 同意書

かわぐち腎泌尿器科・内科クリニック

- ① 私は満 20 歳以上です
- ② 配偶者の同意を得ています ※現在配偶者がいる場合のみ
- ③ 手術の方法について説明を受け、リスクについて理解しました
- ④ 術後、しばらくの間は精液に精子が含まれているため、精液検査で精子が見られなくなるまで、避妊が必要なことの理解しております
- ⑤ 精管奇形のため、3 本目の精管が存在している場合やバイパスがある場合には 100%の避妊効果を得られないことを理解しております
- ⑥ 手術の合併症としては、疼痛、出血、皮膚感染症などがあります。
- ⑦ パイプカットの手術を受けた後に、再度精管を開通させる治療は非常に専門性が高く、当院では治療を行っておりません。一度手術を受けた後に、再度妊孕性を得ることは困難であると理解しております

上記すべての項目に関して説明を受け、理解して、手術を受けることに同意します。

\_\_\_\_\_ 年 月 日

氏名 \_\_\_\_\_ ④

(自署の場合は印鑑不要)

(配偶者もしくはパートナー) 氏名 \_\_\_\_\_ ④

(自署の場合は印鑑不要)

## 精管結紮術(パイプカット) 手術説明書


### 1. 麻酔方法

局所麻酔(1%キシロカイン) 表面麻酔(エムラクリーム)

### 2. 手術時間 約 30~60 分

### 3. 手術方法

陰嚢上部に約 1cm 程度の皮膚切開を行います。精管を露出して、精管周囲の組織を剥離していきます。3-0 絹糸にて両端を二重結紮し、精管を切断します。切断した両側断端を電気メスにて凝固します。止血を確認して、表皮を 5-0 バイクルルで縫合します。もう片方にも同様の処置を行って終了です。



### 《手術後の注意点》

- ・直接患部に衝撃がなければ普段の生活やお仕事は当日より可能です。
- ・手術翌日よりシャワーを浴びてください。入浴は2週間以降糸は吸収糸（抜糸は不必要）を使用しますので基本的には1ヵ月前後でなくなると思われます。
- ・性行為は10日後からとなります（要避妊）。1ヵ月後に受診する時までには10回以上射精をしてから来院してください。
- ・精液検査の結果がOKならば避妊の必要がなくなります。
- ・アルコールや激しい運動は1週間控えてください。
- ・術後、10~20回以上射精していただき（マスターベーション含む）、精液検査をいたします。
- ・精液検査の結果が分かるまでは避妊をしてください。